


S'APPRÊTER À CHARGER FORT DÈS QUE POSSIBLE

COURBE DE POUSSE DE L'HERBE EN LORRAINE




LA COUVERTURE DES BESOINS PAR L'HERBE SELON LE CHARGEMENT

Pousse kg MS/j/ha	Couverture des besoins* par l'herbe selon le chargement			
	20 ares/UGB	30 ares/UGB	35 ares/UGB	40 ares/UGB
10	13%	19%	22%	25%
20	25%	38%	45%	51%
30	38%	57%	67%	76%
40	51%	76%	89%	102%
50	64%	96%	111%	127%
60	76%	115%	134%	153%

* Besoins à 15,7 kg de MS/jour/UGB

Exemple d'interprétation :

Avec 40 Kg MS/ha/j de pousse de l'herbe, ce sont 102 % des besoins qui sont couverts pour des pâtures avec chargement de 40 ares/UGB !



La croissance médiane des sites lorrains est de **38 Kg MS/ha/j**.

Certains sites ont de faibles croissances ou n'ont pas pu être mesurés à cause d'une végétation gorgée d'eau voire même sous l'eau.

CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 55 - Fanny Mesot & Tania Korner

CDA 88 - Damien Godfroy & Aurélien Jomier

CDA 54 - Amélie Boulanger & Marion Leclere

3CE - Didier Deleau


Arvalis - Célia Lefebvre

CARTE DES SITES SUIVIS EN LORRAINE EN 2024

CROISSANCE MÉDIANE PAR SITE (KG DE MATIÈRE SÈCHE PAR HA ET PAR JOUR)

Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est - Chambres d'Agriculture du Grand Est, Arvalis-institut du végétal, AgriVair, Lycée agricole de Pixerecourt & le lycée agricole de Château-Salins

DES REPÈRES POUR LA CONDUITE DE PRAIRIE



CÔTÉ MÉTÉO

Une moyenne de 42 mm de pluie est tombée sur nos sites en Lorraine la semaine dernière. Toutes nos stations ont enregistré entre 30 et 50 mm de pluie la semaine passée. En température, les cumuls atteignent en moyenne les 487°C jours. Des jours chauds (+ de 20°C) sont attendus pour ce week-end.

COMMENTAIRES

Bien que le démarrage en végétation se fasse rapidement, les excès d'eau limitent la portance et retardent la mise à l'herbe.

Si en système laitier, les troupeaux peuvent sortir quelques heures en tournant rapidement sur les parcelles afin d'éviter le matraquage, la gestion des troupeaux allaitants ou des génisses est plus compliquée.

→ **En attendant patiemment le ressuyage des parcelles, vous pouvez réfléchir au découpage de celles-ci. Le pâturage tournant va vous permettre de mieux gérer votre ressource. Le cloisonnement permet d'adapter les besoins des animaux à l'herbe disponible, parfois en quantité déjà importante dans vos parcelles. Vous pourrez ainsi mieux gérer les excédents d'herbe par la fauche.**

Le découpage parcellaire vous permettra également d'isoler les parties moins portantes, donc plus sensibles à la compaction. Ces zones sont aussi parfois plus froides, avec une végétation souvent moins avancée.

→ **Les risques de piétinement sont importants mais le printemps et là et l'herbe avance : il faudra donc charger fort dès que possible.**

CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 55 - Fanny Mesot & Tania Korner

CDA 88 - Damien Godfroy & Aurélien Jomier

CDA 54 - Amélie Boulanger & Marion Leclere

3CE - Didier Deleau **Arvalis** - Célia Lefebvre

Animation du réseau - CRAGE - Natacha KOZAK

natacha.kozak@grandest.chambagri.fr - 06 03 65 83 81

A quand l'élevage de buffles ?



La stabilité des chemins laisse à désirer et freine certains animaux à sortir...



Amélie Boulanger 54



CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 55 - Fanny Mesot & Tania Korner

CDA 88 - Damien Godfroy & Aurélien Jomier

CDA 54 - Amélie Boulanger & Marion Leclere

3CE - Didier Deleau

Arvalis - Célia Lefebvre



Damien Godfroy 88

Parcelle en bord de fossé

Animation du réseau - CRAGE - Natacha KOZAK

natacha.kozak@grandest.chambagri.fr - 06 03 65 83 81